

ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO DOPO ESECUZIONE DI CHIRURGIA IMPLANTARE

Gentile Paziente, con questo modulo si riassumono le raccomandazioni generali successive al suo trattamento già oralmente espresse:

- Non guidare o andare in bicicletta nelle due ore successive all'intervento.
- Non sputare, non sciacquare per le 2-3 ore successive.
- Riprendere l'alimentazione solo quando risulti scomparso l'effetto anestetico (da 1 a 4 ore).
- Il giorno dell'intervento si consiglia di limitare l'alimentazione a cibi liquidi e freddi (gelato, succhi di frutta, yogurt, ecc.). Nei giorni seguenti evitare di masticare cibi duri sulla zona dell'impianto.
- Evitare di masticare direttamente sulla zona dell'impianto anche nelle 2-3 settimane successive all'intervento. Se l'impianto si rende visibile, non toccatelo con le dita e non "giocare" con la lingua su di esso.
- Eccetto per la zona della ferita, dove si consiglia di sciacquare con prodotti specifici (clorexidina collutorio puro 0,2% dal giorno successivo all'intervento), si deve regolarmente procedere alla regolare igiene orale secondo le istruzioni fornite. Non utilizzare spazzolini elettrici ed idrogetto.
- Non fumare, non assumere alcolici.
- Parlare poco e non assumere bevande o cibi caldi o eccessivamente consistenti per le 24 successive.
- Onde evitare l'insorgere di emorragie secondarie, si sconsiglia la pratica sportiva il giorno stesso dell'intervento.
- Applicare del ghiaccio sulla zona per le ore successive all'intervento ad intervalli di circa 10 minuti.
- Seguire scrupolosamente le prescrizioni farmacologiche consigliate e le cadenze fissate per i controlli. Le suture vengono generalmente rimosse 7-10 giorni dopo l'intervento.
- Per qualunque dubbio o problema contattare immediatamente il reparto.